

3술(침·구·부항) 동시 시행 관련 심의사례

구분	청구상병	심의결과
3술 (침, 구, 부항) 동시시행	여/70세 척추협착 요추부, 척추전방전위증 요추부 등	○ 진료기록부상 요통 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/54세 경추통 경부	○ 진료기록부상 청구상병과 동일하게 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	남/46세 사지의 통증 손	○ 진료기록부상 우측손 통증 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/41세 대퇴의 타박상, 요통 요추부	○ 진료기록부상 좌측 허벅지 통증, 허리통증 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/70세 신경뿌리병증을 동반한 경추간판장애, 요통, 벨마비	○ 해당요양기관에 동일 상병으로 28일간 입원치료 후 익일에 경추통증, 허리통증, 안면마비 등으로 내원하였으나 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/56세 요추의 염좌 및 긴장	○ 진료기록부상 좌측 요추염좌로 내원하였으며 시술부위, 시술명, 혈명 등의 시술내용과 환자상태가 확인되는 등 3술 동시시행이 타당하다고 판단되므로 인정함.
	남/38세 좌골신경통을 동반한 요통 요추부	○ 진료기록부상 요통, 좌측 둔부 방산통증 등으로 내원하였으며 시술부위, 시술명, 혈명 등의 시술내용과 환자상태가 확인되는 등 3술 동시시행이 타당하다고 판단되어 인정함.
	여/49세 견갑대의 기타 상세불명 염좌 및 긴장, 경추의 염좌 및 긴장	○ 진료기록부상 우측 견갑대 산통 등으로 내원하였으며 시술부위, 시술명, 혈명 등의 시술내용과 환자상태가 확인되는 등 3술 동시시행이 타당하다고 판단되어 인정함.
	여/61세 요추 및 골반의 기타 및 상세불명 부분의 염좌 및 긴장	○ 진료기록부상 좌측 요통증, 양측 등근육 긴장 등으로 내원하였으며 시술부위, 시술명, 혈명 등의 시술내용과 환자상태가 확인되는 등 3술 동시시행이 타당하다고 판단되어 인정함.
	남/52세 기타근통 아래다리	○ 진료기록부상 우측 무릎통증으로 내원하였으나 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	남/46세 요통 요추부, 경추통 경흉추부 등	○ 진료기록부상 허리통증, 목통증 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/67세 기타근통 어깨부분, 경추통 경부 등	○ 진료기록부상 청구상병과 동일하게 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	남/57세 외측상과염, 기타근통 어깨부분	○ 진료기록부상 좌측 팔꿈치 통증, 우측 어깨 통증 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.
	여/58세 어깨관절의 염좌 및 긴장	○ 진료기록부상 한달전쯤 골프연습 하다가 어깨 삐끗하여 야간통 등으로 내원하였으나 환자상태에 대한 경과기록이 없고 구체적인 시술부위 등 기록이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.

○ 소아환자의 치료에 있어서는 시술행위의 선택에 제한이 있으므로 신중을 기했을 개연성이 있으나 진료기록부상 환자상태 변화에 대한 경과기록 및 구체적인 시술부위 등이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 **3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.**

○ 소아환자의 치료에 있어서는 시술행위의 선택에 제한이 있으므로 신중을 기했을 개연성이 있으나 진료기록부상 환자상태 변화에 대한 경과기록 및 구체적인 시술부위 등이 확인되지 아니하여 3술 동시 시행에 대한 의학적 타당성이 부족하므로 **3술 중 2술(침술 및 부항술)만 인정함.**